



BSTY. Trần Phước Kim Hùng
mobile: 0919906246

TS. Nguyễn Như Phô
mobile: 0908032133

BSTY. Trương Nguyễn Huy Cường
mobile: 0908314188

Bộ phận tư vấn kỹ thuật: (miễn phí cuộc gọi)
18001536

Anova®
WHO - GMP

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI



Chứng Chỉ WHO- GMP
cho tất cả dây chuyền sản phẩm



Chứng Chỉ
ISO/IEC: 17025



Chứng Chỉ Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao 2015



CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

Số 36 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore,
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (0650) 3.782.770 - Fax: (0650) 3.782.700
E.mail: info@anova.com.vn - Website : <http://www.anova.com.vn>



QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI AO

GIẢI ĐOẠN	CHỈ ĐỊNH	SẢN PHẨM	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG	GHI CHÚ
Chuẩn bị ao	Xử lý môi trường nguồn nước ao trước khi thả cá.	AVAXIDE	1ml/ m ³ nước ao.	Xử lý 3 ngày trước khi thả nuôi.
		- ZEOFISH - hoặc NOVA-PRO VS FISH	- 1kg/ 250m ³ nước ao - 20lít/ 1hecta đáy ao	Xử lý 1 ngày trước khi thả nuôi.
Cá giống trước khi thả nuôi	<i>Ngoại ký sinh trùng:</i> Trùng mỏ neo, rận cá, trùng bánh xe, các loại sán lá.	SEAWEED	2,5 ml/ m ³ nước.	Tắm cá trong 25-30 phút.
	Bị vết thương, xây xát ngoài da do đánh bắt, vận chuyển.	Sử dụng 1 trong các chế phẩm sau: NOVA-FLO 500, FLOR 2000, NOVA-OXYTETRA 500.	Sử dụng theo liều hướng dẫn trên nhãn.	Trộn cho ăn liên tục 3 ngày hoặc pha nước tắm cá.
3 tháng đầu sau khi nuôi	* Ngoại ký sinh trùng.	Chọn 1 trong 2 sản phẩm: - SEAWEED - NOVA-PARASITE	- 2-2,5 lít/ 1.000 m ³ nước. Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều xuống ao. - 1 kg với 250-300 kg thức ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức ăn tự chế biến.	- Mỗi tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần. - Cho ăn liên tục 2-3 ngày.
	* Các bệnh do vi khuẩn: đốm đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột, gan sưng có mủ, phù đầu, trắng đuôi, sưng chướng bụng, tuột nhớt, tuột vảy, xuất huyết ở da.	Sử dụng 1 trong các chế phẩm sau: NOVA-FLO 500, FLOR 2000, NOVA-SULTRIM 240.	Dùng theo liều ghi trên toa nhãn thuốc.	Phòng bệnh: 2 tuần cho ăn một đợt 2-3 ngày. Trị bệnh: dùng liên tục trong 5 ngày.
	* Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000 m ³ nước ao.	Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.
	* Cung cấp chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng.	Sử dụng kết hợp NOVA-C hoặc với một trong các thuốc bổ sau: NOVA-FM, NOVAMIX, NOVA-PREMIX FOR FISH, NOVAMIN F.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Cho ăn liên tục.
	* Xổ giun , sán cho cá.	- Dùng sản phẩm: NOVA-PRAZIQUANTEL	- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá, cho ăn liên tục 3-5 ngày.	Xổ vào tháng thứ 3.
	* Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, SORBIMIN, HEMAFISH.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Trộn cho cá ăn liên tục
	* Xử lý ao bị ô nhiễm.	Dùng một trong các sản phẩm sau: NOVA-PRO VS FISH, ZEOFISH, NB 25, NOVA-YUCCA PLUS.	Dùng theo liều hướng dẫn trên toa nhãn.	Định kỳ mỗi tháng xử lý 1 lần.
Từ tháng thứ 4 cho đến khi thu hoạch	* Ngoại ký sinh trùng.	SEAWEED	2-2,5 lít/ 1.000 m ³ nước. Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều xuống ao.	Mỗi tuần xử lý 1 lần. trong 2 tuần.
	* Các bệnh do vi khuẩn: đốm đỏ, lở loét toàn thân, viêm ruột, gan sưng có mủ, phù đầu, trắng đuôi, sưng chướng bụng, tuột nhớt, tuột vảy, xuất huyết ở da.	Sử dụng 1 trong các chế phẩm sau: COTRIMIN, NOVA-FLO 5000, NOVA-AMPI.COL FISH, NOVA-OXYTETRA 500.	Dùng theo liều hướng dẫn trên toa nhãn.	Phòng bệnh: Cứ 2 tuần cho ăn một đợt 2-3 ngày. Trị bệnh: dùng liên tục trong 5 ngày.
	* Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000 m ³ nước ao.	Mỗi 2 tuần xử lý 1 lần.
	* Cung cấp chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng và kích thích tăng trưởng.	Sử dụng kết hợp NOVA-MIN-LEC FOR FISH hoặc NOVA-C với một trong các loại sau: PROBIO FISH, NOVAZYME F, NOVA-ANTI SHOCK FISH, NOVA-BACILAC FISH.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Cho ăn liên tục đến khi xuất bán.
	* Xổ giun , sán cho cá.	Chọn 1 trong 2 sản phẩm: - NOVA-PRAZIQUANTEL - NOVA-PARASITE	- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá. - Trộn 1 kg với 250-300 kg thức ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức ăn tự chế biến.	Xổ vào lúc cá 6 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào cử sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	* Bỏ gan - Phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan.	Sử dụng một trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, HEMAFISH.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Trộn cho ăn liên tục.
	* Xử lý ao bị ô nhiễm.	Dùng một trong các sản phẩm sau: NOVA-PRO VS FISH, ZEOFISH, NB 25, NOVA-YUCCA PLUS.	Dùng theo liều hướng dẫn ghi trên toa nhãn.	Định kỳ mỗi tháng xử lý 1 lần.

Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA CHO CÁ NUÔI BÈ

GIẢI ĐOẠN	CHỈ ĐỊNH	SẢN PHẨM	LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG	GHI CHÚ
Chuẩn bị bè	Xử lý bè trước khi thả cá. Chọn 1 trong 3 chế phẩm sau:	AVAXIDE	200 ml/ 100 m ³ nước bè, xử lý trước khi thả nuôi 3 ngày.	Dùng bạt che kín 4 phía, không cho nước lưu thông, ngâm bè trong 1 ngày, mở bạt cho nước mới vào trước khi thả cá
		NOVADINE	250ml/ 100m ³ nước bè, xử lý trước khi thả nuôi 3 ngày	
Cá giống trước khi thả nuôi	Ngoại ký sinh trùng: Trùng mỏ neo, rận cá, trùng bánh xe, các loại sán lá ...	SEAWEED	500ml/100m ³ nước bè, dùng để tắm cá.	Dùng bạt che kín 1 đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng. Tắm cá trong 25-30 phút.
	Bị vết thương, xây xát ngoài da do đánh bắt, vận chuyển.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: NOVA-FLO 500, NOVA-SULTRIM 240, FLOR 500 FOR FISH.	Dùng liều theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.	Trộn cho ăn liên tục 3 ngày hoặc pha nước tắm cá.
3 tháng đầu sau khi thả nuôi	1. Ngoại ký sinh trùng:	SEAWEED	500ml/ 100m ³ nước bè. Mỗi tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần.	Dùng bạt che kín 1 đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất huyết, viêm ruột, gan sưng có mủ, sưng chướng bụng ...	Dùng một trong các loại sau: NOVA-FLO 5000, FLOR 2000, COTRIMIN, NOVA-AMPI.COL FISH, NOVA-SULTRIM 240.	Trộn thuốc vào thức ăn theo liều trên toa nhãn.	Phòng bệnh: Mỗi 2 tuần dùng một đợt thuốc 2 ngày. Trị bệnh: Dùng liên tục trong 5-7 ngày
	3. Bệnh nấm da, nấm mang.	NOVADINE	2,5 lít/ 1.000m ³ nước	Dùng bạt che kín một đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	4. Tăng sức kháng bệnh và kích thích sinh trưởng trong quá trình nuôi.	Dùng kết hợp NOVA-C với 1 trong các sản phẩm sau: NOVAZYME F, NOVA-FM, NOVA-PREMIX FOR FISH.	Trộn vào thức ăn theo liều trên nhãn sản phẩm	Dùng thường xuyên trong thức ăn.
	5. Xổ giun , sán cho cá.	* Chọn 1 trong 2 sản phẩm: - NOVA-PRAZIQUANTEL - NOVA-PARASITE	- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá. - Trộn 1kg với 250-300 kg thức ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức ăn tự chế biến.	Xổ vào lúc cá 3 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào cử sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	6. Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, SORBIMIN, HEMAFISH.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Trộn cho cá ăn liên tục.
Từ tháng thứ 4 đến khi thu hoạch	1. Ngoại ký sinh trùng.	SEAWEED	2-2,5 ml/ 1m ³ nước bè. Mỗi tuần xử lý 1 lần, trong 2 tuần.	Dùng bạt che kín một đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	2. Các bệnh do vi khuẩn: Đốm đỏ, lở loét, trắng đuôi, tuột nhớt, tuột vảy, phù đầu, xuất huyết, viêm ruột, gan sưng có mủ, sưng chướng bụng ...	Dùng một trong các loại sau: NOVA-FLO 500, NOVA-FLO 5000, COTRIMIN, NOVA-SULTRIM 240, NOVA-OXYTETRA 500.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Phòng bệnh: Cứ mỗi 2 tuần dùng một đợt thuốc 2 ngày. Trị bệnh: Dùng liên tục trong 5 ngày.
	3. Bệnh nấm da, nấm mang.	Dùng NOVADINE	Dùng liều theo toa nhãn, 1 tuần xử lý 1 lần.	Dùng bạt che kín một đầu của bè hoặc xử lý khi nước đứng.
	4. Tăng sức kháng bệnh và kích thích sinh trưởng trong quá trình nuôi, giảm tỷ lệ chết tăng năng suất.	Dùng kết hợp NOVA-C với 1 trong các sản phẩm sau: NOVAMIX, PROBIO FISH, NOVA-FM, NOVA-ANTI SHOCK FISH, NOVA-BACILAC FISH.	Trộn vào thức ăn.	Dùng liên tục trong thức ăn cho đến khi thu hoạch.
	5. Xổ giun , sán cho cá.	* Chọn 1 trong 2 sản phẩm: - NOVA-PRAZIQUANTEL - NOVA-PARASITE	- Trộn 1,5kg/ 200kg thức ăn hoặc 1,5kg/ 5 tấn cá. - Trộn 1 kg với 250-300 kg thức ăn viên hoặc 1000-1200 kg thức ăn tự chế biến.	Xổ vào lúc cá 6 tháng tuổi. Cho ăn ngày 1 lần vào cử sáng, trong 3-5 ngày liên tục.
	6. Bỏ gan – phòng trị các bệnh về gan như: suy gan, mỡ vàng, thịt vàng, gan có mủ, viêm gan.	Sử dụng 1 trong các sản phẩm sau: HEPATOL, NOVITOL, HEMAFISH.	Trộn thuốc vào thức ăn.	Trộn cho cá ăn liên tục.

Quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP