



QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA TRONG CHĂN NUÔI HEO



QUY TRÌNH SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN WHO-GMP
HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC ANOVA TRONG CHĂN NUÔI HEO

Biên soạn: TS. Nguyễn Như Pho

I. GIAI ĐOẠN HEO NÁI:

GIAI ĐOẠN	SẢN PHẨM	LIỀU SỬ DỤNG	CHỈ ĐỊNH
Trước và sau khi phối giống	- Nova E-Selen 500 - Nova-Biotin - Nova-AD.Tricalphos hoặc Nova-Calvit Plus - Nova-ADE Vita	- 1kg / tấn thức ăn - 1kg / tấn thức ăn - 3kg / tấn thức ăn - 100g/20kg thức ăn - Tiêm 5ml/nái/lần, 2-3 tuần dùng 1 lần	- Cho ăn liên tục giúp heo mau lên giống, tăng tỉ lệ đậu thai, phòng ngừa khô thai, chết thai, sảy thai. - Ăn liên tục giúp lông da bóng mượt, ngừa đau móng, nứt móng, viêm da, lở da ở heo. - Cung cấp Calci, Phospho và các Vitanim để ngừa đau móng, bại liệt, thối móng, yếu chân ở heo nái. - Tăng tỷ lệ lên giống, tỷ lệ đậu thai, giúp an thai trong giai đoạn mang thai.
Trước khi sinh 2 tuần	- Nova-Mectin 1%	- 1ml/32kg thể trọng, tiêm dưới da	- Phòng nội ngoại ký sinh trùng lây sang heo con.
Trước khi sinh 1 tuần	- Dùng Sowmilk - Kết hợp với Nova-Thyromin - Novasal	- 1kg/ 100kg thức ăn - 1,5kg/ tấn thức ăn - 10 - 20ml/ con	- Cho ăn liên tục đến khi tách con để kích thích heo mẹ tạo nhiều sữa, gúp heo con đồng đều, tăng trọng lượng cai sữa. - Tăng cường sức đề kháng cho heo.
Ngày sinh	- Dùng Novasal - Kết hợp Nova-Calcium B ₁₂ - Nova-Amdecol hoặc Nova-Cefur	- 10-20ml/con - 1ml/5 kg thể trọng, tiêm 1 lần trước khi sinh 24h - 1ml/10kg thể trọng - 1-3ml/50kg thể trọng	- Giúp mau phục hồi sức khỏe, tiết nhiều sữa. - Phòng ngừa sốt sữa, bại liệt trên heo nái sau khi sinh. - Phòng ngừa viêm vú, viêm tử cung.
Trong thời gian nuôi con	- Nova-AD.Tricalphos hoặc Nova-Calvit - Nova-ADE B.Complex	- 3kg/ tấn thức ăn - 2 gram/ kg thức ăn	- Cung cấp Calci, Phospho và các Vitanim để ngừa bại liệt, yếu chân trên heo nái. - Cho ăn liên tục để heo nái khỏe mạnh tạo nhiều sữa và nhanh phục hồi khi cai sữa.
Trước khi cai sữa	- Nova-ADE Vita - hoặc Novasal - hoặc Nova-Swine Promoter	- Tiêm 5 -10ml/ con - Tiêm 5 -10ml/ con - Trộn ăn 20g/con/ngày, dùng liên tục 4-5 ngày	- Giúp heo nhanh lên giống trở lại, tăng hoạt động buồng trứng, kích thích rụng trứng nhiều.

II. GIAI ĐOẠN HEO CON SƠ SINH ĐẾN CAI SỮA:

GIAI ĐOẠN	SẢN PHẨM	LIỀU SỬ DỤNG	CHỈ ĐỊNH
1 Ngày	- Nova-Enrocol	- 1ml/con, ngày 2 lần	- Phòng trị bệnh tiêu chảy.
3 Ngày	- Nova-Colispec hoặc Nova-Anti Coli - Chọn 1 trong 2: Nova-Fe+B ₁₂ hoặc Nova Fer100	- 1ml/ con (Cho uống) - 1ml/ con (Cho uống) - 1ml/ con (Tiêm bằng kim nhỏ)	- Phòng ngừa tiêu chảy, viêm ruột. - Phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt.
5 Ngày	- Nova-Coc 5% - Nova-ADE Vita	- 1ml/ con (Cho uống 1 lần duy nhất) - 1ml/ con, tiêm bắp	- Phòng ngừa tiêu chảy do cầu trùng trên heo con. - Nâng cao sức đề kháng, tăng trưởng nhanh.
7 Ngày	- Dùng Sowmilk hoặc Super Milk - Nova-Colispec hoặc Nova-Anti Coli	- Hòa 1kg/ 2-3 lít nước ấm cho uống tự do đến khi cai sữa hoặc trộn vào thức ăn. - 1ml/ con (Cho uống).	- Bổ sung lượng sữa cao cấp giúp heo con mau tập ăn, lớn nhanh, trọng lượng cai sữa đồng đều. - Phòng bệnh tiêu chảy trên heo con.

10 Ngày	- Chọn 1 trong các loại sau: Nova Fe+B₁₂ hoặc Nova Fer100 - Nova-Colispec hoặc Nova-Coli Stop	- 2ml/ con (Tiêm bằng kim nhỏ) - 1ml/ con (Cho uống) - 1ml/ con (Cho uống)	- Bổ sung sắt lần 2 cho heo con, phòng bệnh thiếu máu do thiếu sắt ngừa tiêu chảy phân trắng, kích thích tăng trọng. - Phòng ngừa tiêu chảy, viêm ruột.
11 Ngày đến cai sữa	- Nova-Bactic - Novasal - Nova-Colispec hoặc Nova-Coli Stop hoặc Nova-Coldox - hoặc dùng Nova-Neo coli	- 1 gram/ 1 lít Nova-Milk đã pha với nước. - Tiêm 1ml/ con, tuần 1 lần - 2ml/ con, cho uống tuần 1 lần. - 1g/2 lít nước, 3-5 ngày liên tục. - 1g/2 lít nước hoặc 1g/kg thức ăn, trong 3 ngày liên tục.	- Bổ sung vi sinh vật có lợi giúp ngừa tiêu chảy, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trọng nhanh. - Kích thích tăng trọng, chống còi. - Phòng bệnh tiêu chảy trên heo con.

III. GIAI ĐOẠN SAU CAI SỮA ĐẾN HEO LÚA:

GIAI ĐOẠN	SẢN PHẨM	LIỀU SỬ DỤNG	CHỈ ĐỊNH
Ngày cai sữa	- Novasal - Elec-C hoặc Nova-C Plus hoặc Nova-Dextrolytes - Dùng Nova-Ampicol	- Tiêm 2ml/ con - 1gram/ lít nước - 1gram /2 lít nước - 1gram/ lít nước - 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, 3 ngày liên tục	- Tăng sức đề kháng, giảm Stress do cai sữa, nhập, tách bầy. - Cho uống tự do nhằm chống Stress do tách bầy, chuyển chuồng, nâng cao khả năng kháng bệnh. - Phòng bệnh sưng phù đầu, tiêu chảy.
Sau cai sữa	- Sau đó trộn 1 trong 3 loại men sau: Nova-Multizym hoặc Nova-Enzym hoặc Nova-Bactic	- 3kg/ tấn thức ăn - 1kg/ 100kg thức ăn - 1,5g/ 1 lít nước	- Bổ sung vi sinh vật có lợi và men tiêu hoá giúp ngừa tiêu chảy, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trọng nhanh.
Heo lúa (20kg đến 50kg)	- Nova-Mectin 1% (khi heo 20-25kg). - 5 ngày sau cai sữa dùng Nova-Doxine hoặc Nova-Trimedox - Nova-ADE B.Complex hoặc Nova-Vita Plus - Defaty	- 1ml/ 32kg trọng lượng (tiêm dưới da) - 1g/kg thức ăn, dùng liên tục 4 ngày, mỗi 2 tuần dùng 1 đợt thuốc - 1 gram/ kg thức ăn - 1 gram/ 2 lít nước - 0,5kg/ tấn thức ăn	- Tẩy nội ngoại ký sinh trùng trên heo. - Phòng ngừa viêm phổi do <i>Mycoplasma</i> kết hợp với vi trùng. - Bổ sung Vitamin giúp heo tăng trọng nhanh, giảm stress do chuyển chuồng. - Cho ăn liên tục giúp heo nở mông, nở đuôi, thịt đỏ.
Heo thịt (50kg đến xuất bán)	- Nova-Chrom Yeast - Ade-B.Complex Inj - Nova-Mectin 1% (Lúc Heo 50-60kg) - Dùng Nova-Lincodox hoặc Nova-Flodox	- 400gram/ tấn thức ăn - 1ml/ 25-30kg trọng lượng, 2 tuần/ 1lần - 1ml/ 32kg trọng lượng (tiêm dưới da) - 2g/ kg thức ăn, dùng 3 ngày liên tục, 2 tuần dùng 1 đợt. - 1g/3lít nước hoặc 1g/1.5kg thức ăn hoặc 1g/30-40kg thể trọng, trong 3 ngày	- Cho ăn liên tục nhằm bổ sung Chrom hữu cơ giúp heo nở mông, bung đuôi, tăng nạc, tạo màu đỏ hồng cho cơ. - Tăng sức đề kháng, tăng trọng nhanh, lông da bóng mượt. - Tẩy sạch nội ngoại ký sinh trùng. - Phòng bệnh hô hấp, tiêu hóa.

- * LƯU Ý:

- Thức ăn hỗn hợp trộn sẵn hoặc thức ăn viên: Không trộn thêm các loại **NOVAMIX**.

- Thức ăn tự trộn: sử dụng thêm các **NOVAMIX** của Công ty LD TNHH Anova theo các giai đoạn sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	GIAI ĐOẠN	LIỀU SỬ DỤNG	CHỈ ĐỊNH
1	NOVAMIX 3	Heo lúa (20-50kg)	Trộn 1kg/ 250 kg thức ăn. Cho ăn liên tục.	Kích thích tăng trọng nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng sức đề kháng với bệnh đường hô hấp.
2	NOVAMIX 4	Heo thịt (50-90kg)	Trộn 1kg/ 400 kg thức ăn. Cho ăn liên tục.	Tăng trọng nhanh, tăng tích lũy nạc, hạn chế mỡ, giảm chi phí thức ăn, tăng sức đề kháng bệnh.
3	NOVAMIX 5	Heo nái, heo nọc	Trộn 1kg/ 400 kg thức ăn. Cho ăn liên tục.	Giúp heo nái phát triển tốt, tăng khả năng lên giống, đậu thai, tăng tiết sữa, tăng chất lượng tinh trùng trên heo nọc.



BSTY. Trần Phước Kim Hùng
mobile: 0919906246

TS. Nguyễn Như Phô
mobile: 0908032133

BSTY. Trương Nguyễn Huy Cường
mobile: 0908314188

Bộ phận tư vấn kỹ thuật: (miễn phí cuộc gọi)
18001536



Chứng Chỉ WHO- GMP
cho tất cả dây chuyền sản phẩm



Chứng Chỉ
ISO - IEC 17025



Chứng Chỉ Hàng Việt Nam
Chất Lượng Cao 2017



CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

Số 36 Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0650) 3.782.770 - Fax: (0650) 3.782.700

E.mail: info@anova.com.vn - Website : <http://www.anova.com.vn>